

# 鼻噴霧用ステロイド 比較表

一般名	ベクロメタゾン プロピオン酸エステル		フルチカゾン プロピオン酸エステル			モメタゾン フランソールプロピオン酸エステル		フルチカゾン フランソールプロピオン酸エステル		デキサメタゾン シロキシプロピオン酸エステル	
商品名	リノコート®		フルナーゼ®			ナゾネックス®		アラミスト®		エリザス®	
適応	アレルギー性鼻炎、血管運動性鼻炎					アレルギー性鼻炎					
剤形	カプセル パブリザー® に装填	パウダー スプレー	点鼻液 28噴霧用	点鼻液 56噴霧用	点鼻液 小児用 56噴霧用	点鼻液 56噴霧用	点鼻液 112噴霧用	点鼻液 56噴霧用	点鼻液 120噴霧用	カプセル外用 ツインライザー® に装填	点鼻粉末
成人 用法・用量	1日2回 1回1噴霧	1日2回	1日2回 (1回1噴霧) 1日最大8噴霧		—	1日1回 左右1回2噴霧		1日1回 左右1回2噴霧		1日1回 1回1噴霧 ツインライザー® で左右同時噴霧	1日1回 左右1回1噴霧
成人 1日量	100 µg	適宜増減	200~400 µg (1回 50 µg)		—	200 µg (1回 50 µg)		110 µg (1回 27.5 µg)		400 µg	400 µg 1回 200 µg
小児 用法・用量	1日2回 1回1噴霧	1日2回	—		1日2回 (小児用) 左右1回1噴霧 1日最大8噴霧	12歳未満 1日1回 (左右1回1噴霧)		15歳未満 1日1回 (左右1回1噴霧)		—	
小児 1日量	100 µg	適宜増減	—		100~200 µg 1回 25 µg	100 µg (1回 50 µg)		55 µg (1回 27.5 µg)		—	
小児 使用可能年齢	6歳以上		—		5歳以上	3歳以上		2歳以上		—	
空打ち	—		7回			10回		6回		—	
1本で 使用可能 日数	—	15日 60噴霧分 1日4噴霧と仮定 したとき	7日分 1日4噴霧と仮定 したとき	14日分 1日4噴霧と仮定したとき		成人：14日 小児：28日	成人：28日 小児：56日	成人：14日 小児：28日	成人：30日 小児：60日	—	14日
B.A.	ほぼ0%		1%以下			0.2%未満		平均0.5%		14.0%	
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>作用発現が早い</li> <li>生体内高分子化合物 HPCにより鼻腔粘膜に効果的に沈着する</li> <li>アンテドラッグのため吸収されても失活</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ベクロメタゾンより抗炎症作用が強い</li> <li>特異なおいがあり不快感を感じることがある</li> <li>効果発現に数日かかる</li> <li>くしゃみ・鼻水・鼻詰まりの3症状に等しく効果あり</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>ベクロメタゾンより抗炎症作用が強い</li> <li>特異なおいがあり不快感を感じることがある</li> <li>ステロイドの全身作用はほぼない</li> <li>ベンザルコニウム含有</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>受容体への結合力は最も強力</li> <li>鼻・眼反射により目の痒みなどの目の症状にも効果が報告</li> <li>噴霧流量が少ない</li> <li>液だれが生じにくい</li> <li>フルナーゼよりも効果発現が早い</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>作用発現に1週間程度時間がかかる</li> <li>添加物が入っていないので刺激性が少ない</li> </ul>	

注) 内容の最終確認は参考文献等で行ってください。

参考文献) ● 各種添付文書・インタビューフォーム  
● 児島 悠史 著：薬の比較と使い分け 羊土社 2017  
● 高久 史磨 監修：治療薬ハンドブック2020 じほう