

添付文書上の 避妊薬 比較

薬剤名	アンジュ® (トリキュラー・ラベルフィーユ)							マーベロン® (ファボワール)			シンフェーズ®			ミレーナ®	ノルレボ®	
	21錠		28錠					21錠	28錠		T28錠					
適応	避妊							避妊			避妊			避妊・過多月経・月経困難症 未経産婦には第一選択の避妊法としない	緊急避妊	
作用機序	排卵抑制 (着床阻害・精子通過障害)														子宮腺の萎縮、間質の脱落膜化 などの形態変化	排卵抑制 (受精障害・着床阻害)
製剤の色	赤褐	白	黄	赤褐	白	黄	赤	白	白	緑	淡青	白	だいたい	—	白	
製剤の錠数	6	5	10	6	5	10	7	21	21	7	12	9	7	—	1	
黄体ホルモン	レボノルゲストレル			レボノルゲストレル				デソゲストレル	デソゲストレル		ノルエチステロン			レボノルゲストレル	レボノルゲストレル	
成分量 (mg)	0.050	0.075	0.125	0.050	0.075	0.125	0	0.15	0.15	0	0.5	1.0	0	52	1.5	
卵胞ホルモン	エチニルエストラジオール							エチニルエストラジオール			エチニルエストラジオール			—	—	
成分量 (mg)	0.030	0.040	0.030	0.030	0.040	0.030	0	0.030	0.030	0	0.035	0.035	0	—	—	
1シートあたりの錠数	21錠		28錠					21錠	28錠		28錠			—	1錠	
プラセボ	—		7錠					—	7錠		7錠			—	—	
服用開始日	月経第1日目から		月経第1日目から					月経第1日目から	月経第1日目から		月経が始まった次の日曜日から (日曜日に月経が始まった場合はその日から)			月経開始後7日以内 条件：分娩後6週以降、骨盤内手術回復後 他	性交後72時間以内	
用法・用量	21日間連続+7日間休業		28日間連続					21日間連続 +7日間休業	28日間連続		28日間連続経口投与 (28日周期)			産婦人科専門医により子宮内に装着	1回のみ服用	
別途避妊期間 (表5)	服用開始が月経第1日目から遅れた場合、1週間は別の方法で避妊										飲み始めの1週間は別の方法で避妊			記載なし	投与後も妊娠の可能性▶適切に避妊	
飲み忘れ時の (表6)	気づいた時点で服用&次回の分は定時に服用、2日以上連続して飲み忘れの場合▶服用中止&次回の月経から再開														—	—
禁忌	20項目							21項目			20項目			15項目	過敏症・重篤な肝障害・妊婦	
併用禁忌	—							ヴィキラックス®			—			—	—	
有効期間	4年6ヶ月							3年			5年			60ヶ月 (5年) (5年を超えないうちに除去または交換)	外箱に表示	
他剤からの切り替え (表3~5)	28日周期終了の翌日から							28日周期終了の翌日から			28日周期終了の翌日から			記載なし	—	
検査・検診 (表7・8)	<ul style="list-style-type: none"> ✓6ヶ月毎 (病歴調査、血圧測定、乳房・腹部検査、臨床検査) ✓1年に1回以上 (骨盤内臓器検査) ✓1年に1回 (子宮頸部の細胞診) ✓乳癌の検査は自己検診するよう指導 														装着後3ヶ月以内、1年後 (以 内)、自然脱出時 その他	投与後、不正性器出血や妊娠初 期の出血を月経と区別できない 場合があり、月経周期を考慮 し、適切な時期に再来院するよ う指導
授乳婦への投与	禁忌 (黄疸・乳房腫大)							禁忌 (黄疸・乳房腫大)			禁忌 (黄疸・乳房腫大)			有益性投与	投与後24時間は授乳回避	
その他・特記事項	相互作用：CYP誘導薬・阻害薬、グルクロン酸抱合を受ける薬剤 (抱合促進)、アセトアミノフェン (硫酸抱合阻害)、SJW														装着時は抗菌薬の予防的投与 (感染性心内膜炎)	相互作用：CYP誘導薬、SJW